







Hälsofrämjande insatser bland personer med olika sjukdomslängd

Rickard Färdig, PhD, PsykosR
rickard.fardig@neuro.uu.se

ÖVERSIKT – PSYKOSR - 2015




SJUKDOMSDURATION




HÄLSOFRÄMJANDE INSATSER/SAMSIJKLIGHET


Hälsofrämjande insatser, PsykosR, 2015




Hälsofrämjande insatser, 10-5 år



Psykiatrisk samsjuklighet, PsykosR, 2015




Psykiatrisk samsjuklighet, 10-5 år




ANDRA TILLSTÅND/AUDIT


Andra tillstånd, PsykosR, 2015




Andra tillstånd, 0-5år



AUDIT, PsykosR, 2015




AUDIT, 0-5år




HYPERTONI


Diastoliskt > 90, PsykosR, 2015




Diastoliskt > 90, 10-50 år



Systoliskt > 140, PsykosR, 2015




Systoliskt > 140, 10-50 år





BMI

BMI>30, PSYKOSR, 2015



BMI>30, 10-5 år



SAMMANFATTNING

PsykosR / 6 år eller längre

- Hälsöfrämjande insatser, 78 %
- Psykiatrisk samsjuklighet, 20 %
- Andra tillstånd, **25 %**
- AUDIT, 40 %
- Diastoliskt blodtryck >90, **24 %**
- Systoliskt blodtryck >140, **30%**
- BMI >30, **41 %**

PsykosR / 0-5 år

- Hälsöfrämjande insatser, 78 %
- Psykiatrisk samsjuklighet, **32 %**
- Andra tillstånd, 10 %
- AUDIT, **42 %**
- Diastoliskt blodtryck >90, 17 %
- Systoliskt blodtryck >140, 20%
- BMI >30, 31 %